
PREPARAZIONE PER RETTOSIGMOIDOSCOPIA

La rettosigmoidoscopia è un esame endoscopico che consente di visualizzare il retto e il sigma, cioè gli ultimi tratti dell'intestino crasso. L'indagine ha una durata di qualche minuto e non richiede normalmente una sedazione, pertanto non è necessario venire accompagnati.

Per eseguire l'indagine è necessario:

- Essere muniti di impegnativa del curante recante la dicitura: RETTOSIGMOIDOSCOPIA con strumento flessibile
- Non è necessario essere a digiuno
- Praticare 3 CLISMA FLEET 2 ore prima dell'esame

ISTRUZIONI PER L'USO:

Posizione: Sdraiarsi sul fianco sinistro con entrambe le ginocchia piegate e le braccia in posizione di riposo. Oppure sedersi nel WC o nel brodo della vasca da bagno.

SOMMINISTRAZIONE:

1. RITIRARE IL CAPPuccio PROTETTORE.

Tirare delicatamente il cappuccio sostenendo il flacone in posizione eretta e afferrando il tappo scanalato con le dita.

2. Con una pressione costante, inserire gentilmente il clisma nel retto con l'estremità diretta verso l'ombelico. Premere il flacone fino a quando quasi tutto il liquido sia uscito. Interrompere l'uso se si incontra resistenza. Forzare il clisma può provocare ferite.

Nota: Non è necessario svuotare completamente il flacone. Il flacone contiene una quantità di liquido superiore a quella necessaria per un uso effettivo, perciò rimarrà un piccolo residuo.

3. Estrarre delicatamente la cannula dal retto. È normale che si verifichi qualche perdita di liquido del clisma. Trattenere per almeno 5 minuti prima di evacuare.

4. Rimettere il clisma usato nell'imballaggio per lo smaltimento.

